

NO.	年齢	性	薬剤投与対象疾患	被疑薬	発症までの投与期間 (M)	副作用名	皮膚障害 Grade	他臓器障害	免疫学的検査異常	経過
1	49	M	クローン病	アダリムマブ	2	脂漏性皮膚炎	2	なし	なし	外用で改善
2	61	F	掌蹠膿疱症		4	その他	2	肝機能障害	なし	中止後以降軽快
3	14	F	若年性特発性関節炎		2	その他	2	なし	なし	発症6日後に皮疹消退
4	20	F	クローン病		1	その他	2	なし	なし	外用で改善
5	47	F	関節症性乾癬		6	乾癬様皮疹	2	なし	抗核抗体+	改善
6	53	F	SAPHO症候群		4	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止後以降軽快
7	72	F	SAPHO症候群		0.8	乾癬様皮疹	2	なし	なし	外用開始後1か月でコントロール良好
8	60	M	尋常性乾癬		2	掌蹠膿疱症様皮疹	2	なし	なし	治療継続中
9	69	F	尋常性乾癬		2	その他	2	なし	なし	治療継続中
10	42	F	成人Still病		40	乾癬様皮疹	2	なし	なし	外用で改善
11	20	F	クローン病		4	その他	2	なし	なし	治療で改善
12	53	F	潰瘍性大腸炎		7	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	1か月後に皮疹消褪
13	66	M	関節症性乾癬		1	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	1か月後に皮疹消褪
14	62	F	関節症性乾癬		10	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	抗核抗体、抗ssDNA、dsDNA抗体、抗SS-A、B抗体	中止後6ヶ月ですべて消退
15	81	M	尋常性乾癬		0.7	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	外用で改善
16	55	M	尋常性乾癬		3	その他	1	なし	なし	継続で横ばい
17	37	F	クローン病		1	(播種状) 紅斑・丘疹	1			
18	28	M	クローン病		36	乾癬様皮疹	1	なし	なし	継続で横ばい
19	73	M	関節症性乾癬		6	乾癬様皮疹	3	なし	なし	中止後以降軽快も遷延
20	69	F	RA		3	掌蹠膿疱症様皮疹	3	なし	なし	中止後も治療継続
21	70	M	関節症性乾癬		1	掌蹠膿疱症様皮疹	3	なし	なし	中止後も治療継続
22	14	F	若年性特発性関節炎		0.25	紫斑	3	なし	なし	中止で改善
23	38	F	クローン病		2	乾癬様皮疹	3	なし	なし	中止しPSL20mg
24	38	F	クローン病		2	掌蹠膿疱症様皮疹	3	なし	なし	中止しPSL20mg
25	20	F	クローン病	12	掌蹠膿疱症様皮疹	3	なし	なし	継続しPSL 10mg	
26	39	F	クローン病	48	脂漏性皮膚炎	2	なし	なし	中止し、4ヶ月CyA内服で皮疹消失	
27	45	M	クローン病	120	脂漏性皮膚炎	2	なし	なし	継続しCyA内服5ヶ月で皮疹改善	
28	38	M	ベーチェット	3	乾癬様皮疹	2	なし	なし	継続し、外用するも皮疹残存	
29	42	M	クローン病	60	掌蹠膿疱症様皮疹	2	なし	なし	継続し外用で改善	
30	36	M	クローン病	30	掌蹠膿疱症様皮疹	2	なし	なし	継続し外用で改善	

NO.	年齢	性	薬剤投与対象疾患	被疑薬	発症までの投与期間 (M)	副作用名	皮膚障害 Grade	他臓器障害	免疫学的検査異常	経過
31	55	M	ペーチェット	インフリキシマブ	24	多形紅斑	2	なし	なし	継続し、改善
32	41	F	膿疱性乾癬		57	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	継続し、外用で改善
33	23	F	大動脈炎症候群		9	乾癬様皮疹	1	なし	なし	中止し、発症7か月後に皮疹消退
34	53	F	クローン病		108	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	継続、PSL10mg1か月後にやや消褪
35	37	F	クローン病		11	掌蹠膿疱症様皮疹	1			継続
36	30	M	クローン病		72	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	継続し、外用で改善
37	66	M	膿疱性乾癬		15	掻痒	1	なし	なし	投与30分で消退
38	38	M	クローン病		60	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	継続し、外用で改善
39	41	F	潰瘍性大腸炎		36	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	継続し、外用で改善
40	41	M	クローン病		6	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用で改善
41	41	M	クローン病		6	乾癬様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用で改善
42	47	M	クローン病		3	掌蹠膿疱症様皮疹	3	なし	なし	中止するも掌蹠を超えて全身に拡大傾向
43	29	M	潰瘍性大腸炎		6	掌蹠膿疱症様皮疹	3	胸鎖関節炎	なし	中止し、PSL20mgで改善
44	66	M	関節症性乾癬		0.25	掌蹠膿疱症様皮疹	3	なし	なし	中止し、プレドニゾン、ネオオラル100mg/日内服し2か月後に皮疹消退
45	69	M	RA	エタネルセプト	0.5	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し、外用2か月後に皮疹消褪
46	67	M	RA		0.3	多形紅斑	2	なし	なし	中止し、外用10日後に皮疹消退
47	14	M	若年性特発性関節炎		2	乾癬様皮疹	2	なし	なし	継続し、外用するも残存
48	46	F	RA		10	ループス様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用4か月後に皮疹消褪
49	83	F	RA		7	(播種状) 紅斑・丘疹	1			継続
50	37	F	クローン病		0.5	(播種状) 紅斑・丘疹	1			継続
51	67	M	RA		2.5	多形紅斑	3	なし	なし	中止し、PSL20mgで改善
52	80	M	RA	ゴリムマブ	4	多形紅斑	2	なし	なし	中止し、外用で5ヵ月後に皮疹消退
53	78	F	RA		2	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	中止し、外用で3週後に皮疹消退
54	47	F	脊椎関節炎		0.03	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用で7ヵ月後に皮疹消退
55	73	F	RA		1	その他	1	なし	なし	継続し、外用治療3ヶ月で消退
56	68	F	RA		4	(播種状) 紅斑・丘疹	3	なし	なし	中止し、ミノマイシン 200mg、PSL 20mg、クラリチン
57	46	M	RA		2	その他	2	なし	なし	中止し、皮疹残存
58	62	M	RA	セルトリズマブ	4	(播種状) 紅斑・丘疹	2			継続
59	52	M	RA		6	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し、外用で改善
60	32	F	RA		6	多形紅斑	1	なし	なし	継続、外用で改善

NO.	年齢	性	薬剤投与対象疾患	被疑薬	発症までの投与期間 (M)	副作用名	皮膚障害 Grade	他臓器障害	免疫学的検査異常	経過
61	65	F	RA	アバダセプト	9	乾癬様皮疹	2	なし	なし	減量し、改善するも残存
62	69	F	RA		20	乾癬様皮疹	2	なし	RF(+), MMP高値	中止し、10ヵ月後に皮疹消退
63	63	M	SAPHO症候群		2	乾癬様皮疹	2	なし	なし	継続し、外用で治療中
64	69	F	RA		60	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し、外用4ヵ月後に改善
65	63	F	RA		12	乾癬様皮疹	2	なし	なし	継続するも、皮疹持続
66	77	F	RA		20	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止
67	61	M	RA		8	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し外用で改善
68	69	F	RA		14	乾癬様皮疹	1	なし	なし	継続し、外用13ヶ月後に皮疹消退
69	59	F	RA		21	乾癬様皮疹	1	なし	なし	継続し、外用7か月後に皮疹消退
70	79	F	RA		18	掌蹠膿疱症様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用で改善
71	87	F	RA		3.75	紫斑	1	なし	RF(+)	中止し、外用1か月後に皮疹消退
72	72	F	RA		30	乾癬様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用3ヶ月で皮疹消退
73	59	M	RA		1	(播種状) 紅斑・丘疹	1	なし	なし	継続
74	78	F	RA		60	乾癬様皮疹	1	なし	なし	継続し外用で改善
75	42	F	RA	トシリズマブ	1	その他	2	なし	なし	継続
76	19	F	若年性特発性関節炎		3	その他	2	なし	なし	中止
77	20	M	高安病、クローン病		24	その他	2	なし	なし	継続し、外用2週間で改善
78	52	F	RA		2	その他	2	なし	なし	中止
79	46	F	成人Still病		1.5	その他	2	なし	なし	中止し、改善
80	51	F	RA		10	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し、外用で改善
81	56	M	RA,クローン病		6	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し、外用で改善
82	30	M	SLE		3	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	中止し、外用で改善
83	84	M	RA		10	多形紅斑	2	なし	RF(+)	中止し、改善
84	67	M	RA		3	乾癬様皮疹	1	なし	なし	中止し、外用6か月後に皮疹消褪
85	62	F	RA		3	(播種状) 紅斑・丘疹	1	肝障害	なし	中止し、外用1か月で消退
86	64	F	RA		10	その他	1	なし	なし	中止し、外用2か月後に皮疹消退
87	44	F	RA		18	乾癬様皮疹	1	なし	なし	継続し、外用で改善
88	23	M	微小変異型ネフローゼ		リツキシマブ	9	多形紅斑	2	なし	なし
89	54	F	血栓性血小板減少性紫斑病	6		その他	2	なし	なし	継続
90	46	F	濾胞性リンパ腫	0.5		(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	中止し、外用で改善
91	61	M	悪性リンパ腫	0.5		(播種状) 紅斑・丘疹	1	なし	なし	継続し、外用で改善
92	46	F	微笑変異型ネフローゼ症候群	5		掻痒	1	なし	なし	継続し、外用で改善

NO.	年齢	性	薬剤投与対象疾患	被疑薬	発症までの投与期間 (M)	副作用名	皮膚障害 Grade	他臓器障害	免疫学的検査異常	経過
93	53	M	尋常性乾癬	セクキヌマブ	2	その他	2	結膜戦	抗核抗体+	継続し、IPD、ザイザルでコントロール
94	45	M	尋常性乾癬		6	その他	2	なし	なし	継続し、外用でコントロール
95	66	M	膿疱性乾癬		1	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	継続
96	53	F	SAPHO症候群		0.75	(播種状) 紅斑・丘疹	1	なし	なし	継続し、外用でコントロール
97	72	M	ATLL	モガムリズマブ	9	その他	2	なし	なし	中止し、外用7日後に皮疹軽減
98	59	F	ATLL		0.75	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	中止し、PSL20mgで改善
99	88	M	末梢性T細胞リンパ腫		2	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	継続し、外用・内服2か月で改善
100	58	F	尋常性乾癬	イクセキズマブ	1.4	その他	2	なし	なし	中止し、リンデロン4mgで改善
101	34	F	蕁麻疹	オマリズマブ	1.5	その他	2	血圧低下	抗核抗体+	中止し、1時間で改善
102	55	F	RA	バシリキシマブ	2	乾癬様皮疹	2	なし	なし	中止し、外用1か月で改善
103	77	F	未分化大細胞リンパ腫	ブレンツキシマブ	0.5	(播種状) 紅斑・丘疹	2	なし	なし	継続し、外用1週間で改善
104	66	M	尋常性乾癬	プロダルマブ	4	その他	2	なし	なし	継続